

Пряний метод дослідження першої загальної крайової задачі для рівняння тепlopровідності в прямокутнику

О.М. Трусевич

кафедра прикладної математики і механіки
Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності
Львів, Україна
trusev14@gmail.com

М.І. Кусій

кафедра прикладної математики і механіки
Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності
Львів, Україна
kusijmiroslava@gmail.com

The direct method research of the first general boundary value problem for the heat equation in a rectangle

O. Trusevych

Department of Applied Mathematics and Mechanics
Lviv State University of Life Safety
Lviv, Ukraine
trusev14@gmail.com

M. Kusij

Department of Applied Mathematics and Mechanics
Lviv State University of Life Safety
Lviv, Ukraine
kusijmiroslava@gmail.com

Анотація—Запропоновано та обґрунтовано пряний метод розв'язування першої загальної крайової задачі для рівняння тепlopровідності в прямокутнику. В основі даного методу використано метод редукції, класичний метод Фур'є, метод власних функцій та власних значень. Перевагою даного методу є власне пряний метод розв'язування даної задачі.

Abstract—A direct method for solving the first boundary value problem for the heat equation in the rectangle was proposed and justified. The basis of this method used a reduction method, the classical Fourier method, method of eigenfunctions and eigenvalues. The advantage of this method is actually a direct method for solving this problem.

Ключові слова—задача на власні значення та власні функції, метод Фур'є, функція Коши, подвійний ряд Фур'є

Keywords—eigenvalue problem and their functions, Fourier method, function Cauchy, double Fourier series

I. ВСТУП

При розв'язуванні нестационарних задач теорії тепlopровідності у випадку, коли температура є функцією

часу і двох просторових координат, виникають значні труднощі. В монографії [1] розглядаються деякі задачі дівовимірного температурного поля, коли розв'язки можуть бути отримані методами інтегральних перетворень. Там, зокрема, розглядається дівовимірна задача для прямокутника, на одній стороні якого підтримується температура, що змінюється в часі. Натомість на трох інших сторонах підтримується нульова температура. Ця задача розв'язується шляхом застосування скінченного синус – перетворення Фур'є з відповідним використанням формули оберненого перетворення.

Останнім часом все активніше при розв'язуванні задач нестационарної тепlopровідності застосовується пряний метод, в основу якого покладено редукцію (зведення задачі до двох простіших, але взаємоз'язаних) з наступним застосуванням модифікованого методу Фур'є власних функцій [1] - [4]. В даній роботі ця ідея використана для розв'язування загальної задачі для прямокутника, коли крайові умови, що залежать від часу, задаються без обмежень на всіх чотирьох його сторонах.

ІІ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ІІ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Розглянемо рівняння тепlopровідності:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) \quad (1)$$

у прямокутнику $\Pi : \{0 \leq x \leq h, 0 \leq y \leq d\}$

з початковою умовою:


$$T(x, y, 0) = f(x, y), \quad (2)$$

крайовими умовами $T|_{\Gamma}$:

$$T|_{\Gamma} : \begin{cases} T(0, y, \tau) = \varphi_1(y, \tau), \\ T(x, 0, \tau) = \psi_1(x, \tau), \\ T(h, y, \tau) = \varphi_2(y, \tau), \\ T(x, d, \tau) = \psi_2(x, \tau) \end{cases} \quad (3)$$

та умовами узгодження в кутових точках прямокутника $\Pi : \{0 \leq x \leq h, 0 \leq y \leq d\}$:

$$\begin{aligned} \varphi_1(0, \tau) &= \psi_1(0, \tau), \varphi_1(d, \tau) = \psi_2(0, \tau), \\ \varphi_2(0, \tau) &= \psi_1(h, \tau), \varphi_2(d, \tau) = \psi_2(h, \tau) \end{aligned} \quad (4)$$



Функцію розподілу температури $T(x, y, \tau)$, як розв'язок задачі (1) - (4) знайдено у вигляді суми двох функцій (метод редукції (див., наприклад, [5]):

$$T(x, y, \tau) = U(x, y, \tau) + V(x, y, \tau). \quad (5)$$

Функція $U(x, y, \tau)$ визначена як розв'язок крайової (квазистаціонарної) задачі Діріхле:

$$\Delta U \equiv \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right) = 0,$$

$$U|_{\Gamma} = T|_{\Gamma},$$

з умовами узгодженості (4) у вигляді, (наприклад, [6]):

$$\begin{aligned} U(x, y, \tau) &= \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \frac{\sinh \frac{\pi n}{h} y}{\sinh \frac{\pi n}{h} d} + B_n \frac{\sinh \frac{\pi n}{h} (d-y)}{\sinh \frac{\pi n}{h} d} \right) \sin \frac{\pi n}{h} x + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \frac{\sinh \frac{\pi n}{d} x}{\sinh \frac{\pi n}{d} h} + D_n \frac{\sinh \frac{\pi n}{d} (h-x)}{\sinh \frac{\pi n}{d} h} \right) \sin \frac{\pi n}{d} y + \\ &+ W(x, y, \tau), \end{aligned}$$

де коефіцієнти A_n, B_n, C_n, D_n обчислюються наступним чином:

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{h} \int_0^h \psi_2(x, \tau) \sin \frac{\pi n x}{h} dx, \\ B_n &= \frac{2}{h} \int_0^h \psi_1(x, \tau) \sin \frac{\pi n x}{h} dx, \\ C_n &= \frac{2}{d} \int_0^d \varphi_2(y, \tau) \sin \frac{\pi n y}{d} dy, \\ D_n &= \frac{2}{d} \int_0^d \varphi_1(y, \tau) \sin \frac{\pi n y}{d} dy, \end{aligned}$$

а $W(x, y, \tau) = A(\tau)xy + B(\tau)x + C(\tau)y + D(\tau)$ - це гармонічна функція, яка забезпечує виконання умов узгодженості [6] в кутках прямокутника $\Pi : \{0 \leq x \leq h, 0 \leq y \leq d\}$.

Функції $A(\tau), B(\tau), C(\tau), D(\tau)$ знаходимо із систем рівнянь:

$$W(0, 0, \tau) = \begin{cases} D(\tau) = \varphi_1(0, \tau), \\ D(\tau) = \psi_1(0, \tau). \end{cases}$$

$$W(0, d, \tau) = \begin{cases} dC(\tau) + D(\tau) = \varphi_1(d, \tau), \\ dC(\tau) + D(\tau) = \psi_2(0, \tau). \end{cases}$$

$$W(h, 0, \tau) = \begin{cases} hB(\tau) + D(\tau) = \psi_1(h, \tau), \\ hB(\tau) + D(\tau) = \varphi_2(0, \tau). \end{cases}$$

$$W(h, d, \tau) = \begin{cases} dhA(\tau) + hB(\tau) + dC(\tau) + D(\tau) = \varphi_2(d, \tau), \\ dhA(\tau) + hB(\tau) + dC(\tau) + D(\tau) = \psi_2(h, \tau). \end{cases}$$

Звідки одержуємо:

$$D(\tau) = \frac{\varphi_1(0, \tau) + \psi_1(0, \tau)}{2},$$

$$B(\tau) = \frac{\psi_1(h, \tau) + \varphi_2(0, \tau) - \varphi_1(0, \tau) - \psi_1(0, \tau)}{2h},$$

$$C(\tau) = \frac{\varphi_1(d, \tau) + \psi_2(0, \tau) - \varphi_1(0, \tau) - \psi_1(0, \tau)}{2d},$$

$$A(\tau) = \frac{\varphi_2(d, \tau) + \psi_2(h, \tau) - \varphi_1(h, \tau) - \psi_2(0, \tau)}{2hd} +$$

$$+ \frac{\varphi_1(0, \tau) + \psi_1(0, \tau) - \varphi_1(d, \tau) - \psi_2(0, \tau)}{2hd}.$$

Функцію $V(x, y, \tau)$ знайдено із неоднорідного рівняння тепlopровідності:

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = a\Delta V - \frac{\partial U}{\partial t} \quad (6)$$

із краївими умовами:

$$V|_{\Gamma} = 0 \quad (7)$$

та початковою умовою:

$$V(x, y, 0) = f(x, y) - U(x, y, 0) \stackrel{df}{=} \varphi(x, y). \quad (8)$$

(6) – (8) - класична мішана задача для функції $V(x, y, \tau)$. Розв'язки відповідної однорідної країової задачі:

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = a\Delta V, \quad V|_{\Gamma} = 0$$

знайдено методом власних функцій та власних значень (див. наприклад, [6]). Її власні значення:

$$\lambda_{mn} = \frac{\pi^2 m^2}{h^2} + \frac{\pi^2 n^2}{d^2}, \quad m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N},$$

а відповідні власні функції:

$$v_{mn} = \sin \frac{\pi m}{h} x \cdot \sin \frac{\pi n}{d} y.$$

Функція $V(x, y, \tau)$, як розв'язок (6) – (8), знайдена у вигляді розвинення в ряд за власними функціями на власні значення:

$$V(x, y, \tau) = \sum_{m,n} t_{mn}(\tau) \sin \frac{\pi m}{h} x \sin \frac{\pi n}{d} y, \quad (9)$$

де $t_{mn}(\tau)$ - функції по часу τ . Для їх знаходження, після підстановки (9) в (6), одержуємо нескінченну сукупність диференціальних рівнянь першого порядку для $t_{mn}(\tau)$:

$$t'_{mn}(\tau) + a\lambda_{mn} t_{mn}(\tau) = -\alpha_{mn}(\tau), \quad (10)$$

$$\text{де } \alpha_{mn}(\tau) = \frac{4}{dh} \iint_{\Pi} \frac{\partial U(x, y, \tau)}{\partial \tau} \sin \frac{\pi m}{h} x \sin \frac{\pi n}{d} y dx dy.$$

Початкова умова для функцій $t_{mn}(\tau)$:

$$t_{mn}(0) = \varphi_{mn}, \quad (11)$$

де φ_{mn} – коефіцієнти подвійного ряду Фур'є за системою власних функцій $\left\{ \sin \frac{\pi m}{h} x \cdot \sin \frac{\pi n}{d} y \right\}$ для функції (8), тобто

$$\varphi_{mn} = \frac{4}{dh} \iint_{\Pi} \varphi(x, y) \sin \frac{\pi m}{h} x \sin \frac{\pi n}{d} y dx dy.$$

Розв'язки сукупності задач Коші (10), (11) мають вигляд:

$$t_{mn}(\tau) = \varphi_{mn} e^{-a\tau(\frac{m^2}{h^2} + \frac{n^2}{d^2})} - \int_0^{\tau} e^{-a\tau(\frac{m^2}{h^2} + \frac{n^2}{d^2})(\tau-s)} \alpha_{mn}(s) ds.$$

Висновки

Запропонована та обґрунтована формальна схема застосування прямого методу розв'язування першої загальної країової задачі для рівняння тепlopровідності в прямокутнику.

Задача розв'язана в найбільш загальній постановці з ненульовими краївими умовами на всіх чотирьох сторонах прямокутника. Розв'язок отримано у вигляді рядів в явній формі.

Запропонована схема без ускладнень може бути поширена на випадки краївих умов другого та третього роду або будь-яких комбінацій таких умов на різних сторонах прямокутника.

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES

- [1] Лыков А. В. Теория теплопроводности. – Москва. – 1967. – 559 с.
- [2] Тацій Р.М., Пазен О.Ю. Общие краевые задачи для уравнения теплопроводности с кусочно-непрерывными коэффициентами / Тацій Р.М., Пазен О.Ю.// Инженерно-физический журнал Национальной Академии Беларуссии. – 2016. - Том 89, № 2. – С.350-361.
- [3] Тацій Р.М. Визначення теплообміну в нескінченній плиті з дискретно-неперервним розподілом тепла/ Тацій Р.М., Кусій М.І., Пазен О.Ю.// Пожежна безпека. Зб. наук. пр. 2012. - №20. – С.20-26.
- [4] Тацій Р.М. Загальна перша країова задача для рівняння тепlopровідності з кусково-змінними коефіцієнтами/ Тацій Р.М., Власій О.О., Стасюк М.Ф.// Вісник національного університету «Львівська політехніка» фіз.-мат. науки. – 2014. – №804. – С.64-69.
- [5] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. – 735 с.
- [6] Положій Г.М. Рівняння математичної фізики, К.: 1959.